

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-4-82962195

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13 ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58 39 02



Charente - Maritime

BULLETIN N° 2 du 7 AVRIL 1982

JAUNISSE NANISANTE

Cette maladie à virus transmise par les pucerons a eu des conditions très favorables cet hiver. De nombreuses cultures d'orge d'hiver sont gravement atteintes. Les orges de printemps sont à protéger soigneusement dès l'arrivée des premiers pucerons si on veut éviter des dégâts identiques.

POUR LES BLES, les semis d'octobre subiront sans doute des chutes de rendement, mais les dégâts sont peu visibles avant l'épiaison.

Il faut rappeler que les contaminations des céréales d'hiver ont eu lieu au cours de l'hiver. Les plantes au stade montaison sont pratiquement résistantes et sauf infestation de pucerons très forte, les traitements insecticides sont inutiles actuellement.

PUCERONS SUR EPIS

Des infestations de pucerons seront à craindre sur épis cette année, si leurs ennemis naturels ne les détruisent pas avant épiaison. De toutes façons, le stade idéal de traitement se situe à l'épiaison : les traitements plus précoces ne font que perturber l'action des insectes auxiliaires, et n'empêchent pas les réinfestations sur épis.

MALADIES DU PIED ET DU FEUILLAGE

Le piétin-verse est resté rare dans les terres de champagne : moins de 20 % de parcelles touchées, attaques faibles. Dans les autres types de terre, les symptômes sont plus fréquents (3 parcelles sur 4) sans que les attaques soient très graves.

OBSERVEZ VOS PARCELLES : un traitement au stade 2 noeuds sera encore parfaitement efficace.

Les maladies du feuillage ont évolué très lentement jusqu'à présent. Le temps plus chaud accélère le développement des épidémies, en particulier pour l'oïdium sur variétés sensibles (Cocagne, Hardi, Talent ...). Si le temps est humide, on assistera à l'apparition de taches de septoriose (contamination de mi-Mars).

SI UN TRAITEMENT EST NECESSAIRE, CHOISISSEZ UN PRODUIT ADAPTE A VOTRE PROBLEME. REPORTEZ-VOUS A LA NOTE D'INFORMATION N° 4.

Imprimé à la Station le 7 Avril 1982

Précédente Note : N° 1 du 17.3.82

72